



VAN GOGHS ตารางอาหาร



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า pH ของน้ำอยู่ที่ 6.5 หรือต่ำกว่าก่อนที่จะเริ่มเพิ่มปุ๋ย โดยเริ่มต้นด้วยการเติม Van Goghs Silicium ก่อน ตามด้วยฐานอาหารปุ๋ยชนิด A จากนั้นเพิ่มส่วนปุ๋ยชนิด B ตามหลัง ตามมาด้วยการเพิ่มสารบำรุงเสริมต่าง ๆ และในท้ายที่สุด ให้เติม Drip Clean โดยรักษาระดับ pH สำหรับดินอยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 สำหรับระบบปลูกในดิน สำหรับระบบไฮโดรโปนิกหรือ ขุยมะพร้าว ให้รักษาค่า pH ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2 และปรับค่า EC ตามความต้องการ

ตารางนี้วัดสารอาหารในมิลลิลิตรสำหรับน้ำ 1 ลิตร

VAN GOGH'S
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS
MADE IN AMSTERDAM



สัปดาห์	ORIGINAL SILICIUM	A & B GROW	A & B FLOWER	MIRACLE C	MIRACLE ROOTS	RADICAL ENZYMES	LEAVE NUTRITION	DRIP CLEAN
ระยะเติบโต สัปดาห์ 1	0.3 มล	2 มล			1 มล	2 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะเติบโต สัปดาห์ 2	0.3 มล	2 มล			1 มล	1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 1	0.3 มล		2 มล		1 มล	1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 2	0.3 มล		2 มล		1 มล	1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 3	0.3 มล		2 มล			1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 4	0.3 มล		2 มล	0.5 มล		1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 5	0.3 มล		2 มล	1 มล		1 มล	ใช้โดยไม่ผสมน้ำ	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 6	0.3 มล		2 มล	1.5 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 7	0.3 มล		2 มล	2 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 8	0.3 มล		2 มล	2.5 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 9	ล้างด้วยน้ำที่ผ่านการกรอง				ล้างด้วยน้ำที่ผ่านการกรอง			



ใช้เมื่อมีการขาดแคลเซียมแมกนีเซียม

ดิน ขุยมะพร้าว ไม่อัด ให้ใช้ 1.25 มล ต่อน้ำ 1 ลิตร
ไฮโดรโปนิกส์ ให้ใช้ 1.65 มล ต่อน้ำ 1 ลิตร
สำหรับการใช้กลางแจ้งในนา ให้ใช้ 1 ลิตรต่อน้ำ 800 ลิตร
ฟอลิเออร์ ให้ใช้ 0.6 มล ต่อน้ำ 1 ลิตร

ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช

วันที่ 1: พ่นทดสอบ
วันที่ 3: พ่น
วันที่ 6: พ่น
วันที่ 9: พ่น



ปริมาณที่แนะนำคือ 50 มล ถึง 100 มล
ผสมกับน้ำ 2 ลิตร สำหรับการป้องกันโรคพืช
ให้ใช้ทุก 7 วัน โดยใช้ 25 มล
ผสมกับน้ำ 2 ลิตร